

DISSERTATIO  
DE  
**COHAESIONE**  
**ET ATTRACTIONE**  
**CORPORVM**

QVAM  
RECTORE MAGNIFICENTISSIMO  
SERENISSIMO PRINCIPE AC DOMINO  
DOMINO  
**GVILIELMO HENRICO**  
DVCE SAXONIAE IVLIACI CLIVIAE MONTIVM  
ANGARIAE WESTPHALIAE ET RELIQA

*PRAESIDE*  
**GE. ERHARDO HAMBERGERO**  
PHILOS. ET MED. DOCTORE ET PROF. PVBL. ORD.  
MEDICO PROVINC. SAXO-VINAR. ET ISNAC.  
ACAD. NAT. CVRIOS. COLLEGA  
*PATRONO ET PRAECEPTORE SVO PIE COLENDO*  
*ERVDITORVM EXAMINI SVBMITTIT*

ET  
DIE XXVI. APRIL. AN. M DCC XXXII.  
CONTRA EORVNDEN DVBIA DEFENDET

*AUCTOR*  
**IOANNES PETRVS SVSSMILCH**  
BEROLINENSIS.

IENTAE LITTERIS RITTERIANIS.



D. 2287 A. 110

COHABITATIONE

ET ATTRACTIO

FORPUM

RECTORI PALATII

RECTORI PALATII

D. 2287 A. 110

GUTRIUM HENRICO

RECTORI PALATII

RECTORI PALATII

D. 2287 A. 110

GEORGIUM HANSEN

RECTORI PALATII

RECTORI PALATII

D. 2287 A. 110

RECTORI PALATII

RECTORI PALATII

D. 2287 A. 110

RECTORI PALATII

D. 2287 A. 110

JOHANNES HENRICH

RECTORI PALATII

RECTORI PALATII



NOBILISSIMO ET DOCTISSIMO  
IOANNI PETRO SÜSSMILCHIO

S. P. D.

IO. GEORGIUS WALCHIVS,  
THEOL. D. ET P. P.

---

**E**X quo huc litterarum caussa venisti, omni opera atque exercitatione ingenii laudem atque ornamentum sectatus es atque ad id tua contulisti studia, ut solidam litterarum diuinarum aequae, ac humanarum scientiam tibi comparares. Qui singularis proficiendi ardor quemadmodum cum egregia facultate fuit coniunctus; ita diligenter praeceptorum scholas frequentando: optimos auctorum libros legendo, et quod omne liberale ingenium decet, ipsam veritatem huiusque rationem meditando, in horum studiorum laudabili cursu praeclaros fecisti progressus. Videmus nunc publicum industriae huius specimen, quo ingenii tui vim in luce ponis ac qua valeas scientia rerum naturalium, luculenter demonstras. Quisque harum litterarum intelligens existimator laudis praemium tibi decernet, tuamque diligentiam, quam ad illas adcurate cognoscendas adhibuisti, haud esse vulgarem, pronuntiabit ac de felicissimo rerum, quas in hac musarum sede egisti, successu te prosequetur gratulatione. Ad me tamen inprimis munus hoc spectat, quoniam praeter alios diligentiae tuae spectator fui. Igitur tibi gratulor patriaeque vberiores ingenii ac virtutis tuae fructus spondeo, quod ut feliciter eueniat, deum orabo atque obsecrabo. Ien. d. xxv. april. MDCCXXXII.

DOCTIS-



DOCTISSIMO DOMINO RESPONDENTI  
IOANNI PETRO SVSSMILCHIO

S. P. D.  
P R A E S E S.


---

**M**ulta sunt quibus Te haëtenus omnibus bonis commendaſti, pietas non fucata, morum elegantia, animi probitas, ingenii alacritas & ardor ad veritatem cognoscendam indefessus: Patronis quoque exteris vt Te commendares, absque ſpecimine eruditionis publico ab Academia haud diſcedendum eſſe putaſti; tradidiſti igitur mihi præſentem diſſertationem phyſicam, doctrinam, difficilem ſane, de *cohæſione & attractione* continentem, proprio Marte elaboratam, quam & ita conſcriptam inueni, vt nihil mutandum, ſed pauca tantum addenda inuenerim. Gratulor hinc Tibi de egregio hocce eruditionis ſpecimine, quod Te absque dubio doctis Patronisque multum commendabit, ita vt ſuperfluum iudicem vltèrius in laudes excurrere Tuas, Deum potius precor, velit Tibi vitam longam ſanitatẽque largiri & in poſterum quoque ſtudiis Tuis benigniſſime aſſeſſe, vt patria fructus inſignes, quos ex Te merito ſperat, cito & diu obtineat. Vale iterumque Vale. Dab. ex muſ.

d. xxv. Apr. M DCC XXXII.







*Q. D. B. V.*

**P**hilosophia naturalis quum sit scientia mutationum, quæ in corporibus eueniunt; illa vero acquiri nequeat, nisi beneficio sensuum rite comparatorum, & ratiociniorum legitimorum, atque ex obseruatibus deductorum: recte omnino vniuersa physicorum celebrium cohors, huius & elapsi seculi, eo est connixa, vt, profligatis veterum chimæris, nihil admitteret in eam, nisi quod in experiētiis, obseruationibus atque experimentis satis esset fundatum. Non obstante tamen summa horum virorum industria atque accuratione, nonnulla adhuc supersunt, quibus calculum omnes adiicere nequeunt, quoniam in experimentis capiendis, contra propositum animi, facillime nonnullæ omitti possunt *περιστάσεις*, quarum tamen maximum est momentum; aut quod in ratiociniis, quæ ex illis formantur, nimis sumus præcipites; aut denique quod sumimus ea, quæ non adsunt. Atque in numerum illarum doctrinarum, quibus nosmet subscribere nequimus, inprimis referimus illam de Attractione a KEILIO in physicam postliminio reuocatam, atque a celeberrimis Angliæ & Belgii viris plerisque adoptatam, atque ad hunc vsque diem propugnatam. Quam quum ex multis aliis eum in finem elegerimus, vt istam examinarem, immo ipsius existentiam, pace summorum virorum, negarem; ordinem, quem in instituto hocce secuti sumus, paucis

A

cis



cis indicabimus. Et primo quidem corporum cohæsionem in immediato sui contactu, tamquam rem omnium consensu firmam, vt axioma posuimus. Dein circumstantias nonnullas, circa cohæsionem obuias, adduximus. Ad causam cohæsionis progrediendo, ac falso adductas remouendo, in ipso corpore eam residere debere, ostendimus. Operam egregiam nobis heic præstiterunt experimenta exactissime a cel. P.V. MVSCHENBROECK, Belgii decore, instituta, siquidem illa abundanter euincunt, pressionem aeris vnicam cohæsionis causam esse non posse, licet socia omnino sit. Porro leges ac regulas cohæsionis a posteriori condidimus, vbi specificæ corporum grauitatis cognitio admodum est necessaria. Periculum equidem insimul fecimus hac occasione, vtrumne a priori regulas cohæsionis determinare liceret; & fatendum nobis est, illud multas difficultates nobis creasse. Hisce præmissis ad examen doctrinæ attractiuæ perreximus, vbi omnis nostra tractatio eo tendit, vt 1) ostendamus, experimenta ad vnum omnia, ex quibus viri celeberrimi vim attractiuam eruere satagunt, facillime ac clarissime solui posse ex solo cohæsionis principio: 2) disputauimus etiam nonnunquam καὶ ἀντιφασίαν, ponendo principium attractionis, & inde legitime inferendo, quæ inferri possunt, vbi patet, leges attractionis non respondere phænomenis, immo his esse contrarias. Id quod nisi esset, vt hypothesin saltem vim attractiuam admittere potuissemus. Quodsi B. L. vberiore partem nostræ dissertationis prioris explicationem desideret, eum ablegamus ad Excell. D. HAMBERGERI, Præsidis ac Præceptoris omni honore semper a nobis prosequendi, *Elementa physica* & inprimis ad eiusdem tractatum, quem inscripsit: *vberior dilucidatio legum adhæsionis*. Partem dissertationis posteriorem attigit quoque cel. WOLFFIUS, summus ille Germanorum philosophus, in opere suo Cosmologico



gico latino. Atque hoc est, quod, deo iuuante, in hoc specimine academico inquirere, nobis est propositum.

## §. I.

**G**rauitas est tendentia corporum naturalis versus terram. Diuiditur in absolutam & respectiuam; siue specificam. Illa corporibus omnibus competit, sine ullo respectu habito ad aliud corpus magis vel minus graue. Grauitas specifica est illa grauitas, qua corpus sub data magnitudine gaudet. Corpus altero dicitur specificè grauius, aut leuius, si illud sub eodem volumine maiorem, vel minorem habet grauitatem altero. Sic aurum dicitur specificè grauius mercurio. Grauitas specifica minor audit etiam leuitas. Vnde aer specificè leuior est aqua, eo quod ille sub eodem volumine minorem habeat grauitatem.

## §. II.

In grauitatibus corporum specificis eruendis ac determinandis occupata est Hydrostatica. Quare vide imprimis cel. WOLFFII scripta mathematica ac Physica. Nihil autem amplius hac ratione elicitur, nisi corporum diuersa grauitas specifica ratione *molis* tantum.

## §. III.

Corporum vero heterogeneous atque porositas causa est, vt ne a diuersa grauitate specifica corporum in tota mole spectatorum argumentari possimus, ad diuersam grauitatem specificam particularum minimarum totum componentium.

## §. IV.

Alio itaque modo grauitates specificæ particularum minimarum sunt explorandæ, nimirum ex subsidentia corporum in fluido. Sequentes igitur heic notandæ sunt regulæ:

1) Omne corpus solidum ex naturali sua densitate in fluido subsidens; quo tamen non est imprægnatum, fluido hoc est



specifice grauius ratione molis & particularum plurimarum totum constituentium.

2) Omne corpus solidum subsidens in fluido, quo impletum est, specifice grauius est, illo fluido ratione particularum minimarum illud constituentium plerarumque.

3) Fluidum alii fluido innatans illo est specifice leuius. De particulis tamen componentibus non semper valet illa consequentia.

### §. V.

Ex his abunde liquet, corpus vnum idemque specifice leuius & specifice grauius dici posse respectu corporis alius. Sequitur autem ex adductis regulis: 1) aurum mercurio esse specifice grauius ratione molis & partium minimarum plurimarum: 2) Argentum, plumbum, cuprum, stannum ratione particularum specifice grauiora esse mercurio: mercurio enim imprægnata in illo subsident, (§. 4. n. 2.) ratione tamen molis sunt specifice leuiora mercurio: 3) Metalla omnia, aqua & liquoribus, ab aqua, grauitate specifica, non multum discrepantibus, esse specifice grauiora, ratione molis & partium. Quumque etiam ligna, aqua aliisque liquoribus repleta, in his fundum petant: patet inde, ligna & corpus quodcunque simili se habens modo, aqua liquoribusque esse specifice grauiora ratione partium minimarum corpus constituentium.

### §. VI.

Hæc de grauitate specifica fuerunt præmittenda, vt recte in sequentibus intelligatur, de quibus nobis sermo sit: intelligimus nimirum vbiuis fere grauitatem specificam partium minimarum. Quilibet etiam ex his percipit, quid ei incumbat, qui de grauitate specifica partium minimarum iudicaturus est. Vberius hæc omnia legis deducta in Excell. D. præsidis physicæ elementis §. 149-152.

### §. VII.



## §. VII.

Contactus immediatus de corporibus prædicatur, quando eorum superficies ita sibi sunt contiguæ, vt omnem tertii alicuius intermediæ actualem existentiam excludant. \*

\* Quum beneficio microscopiorum maximam corporum inæqualitatem etiam in durissimis corporibus atque scabritiem animaduertamus, ita vt planitiem ex vallibus atque montibus constantem quasi repræsentent; quilibet facile videt, corpora sese non in omnibus punctis contingere posse, quando eorum superficies sibi inuicem adplicantur, quin immo verum dixerò, duo vitra plana, quæ exactissimam habere videntur superficiem, in paucissimis sese contingere punctis. Quumque in his cavitatibus plurimum aeris hæere queat, isque aeri ambienti vi elastica sit æqualis: quilibet cognoscet, aerem effectum ex immediato contactu consecuturum plurimum impedire, saltem imminuere posse. Vt vero, quantum fieri potest, hæcce corporum asperitas tollatur, politura opus est; per attritum enim asperitates & prominentiæ adplanantur. Quodsi politio non satis sit, aliud corpus fluidum, quod tamen postea indurefcit, interponitur, id quod cavitates explet seque iis accommodat. Hoc enim interposito 1) maior numerus punctorum contactus obtinetur 2) aer fugatur, dum corpus aliud spatia explet, in quibus aer alioquin commoratur. Hinc, vt contactus inter marmora augeatur, sebo fluente illinuntur. Ex his etiam hoc adhuc dimanat, quod, quo corpus est densius atque specificè grauius, eo maior adsit materiæ quantitas in vno spatio. Maior multitudo particularum minus porositas importat, minor porositas minorem quoque scabritiem in superficie relinquit. Corpora ergo densiora, si accedat politio, in pluribus punctis se contingere possunt, quam porosiora.

## §. VIII.

Cohærere; siue adhærere sibi mutuo corpora dicuntur, quando in immediato sui contactu ita coexistunt,



vt magis resistent viribus illa separaturis, quam cum singula separatim existentia ab iisdem viribus mouentur. \*

\* Exhibet hanc definitionem cel. MVSCHENBROECKIUS in *epitome physicae* suæ, §. 577. p. 145. Quumque illa tantum sit nominalis atque characterem contineat, ex cuius præsentia quilibet cohæsiorem diiudicat: nulla adest ratio, cur illam non admittamus. Et quum cuius pateat, vim requiri ad corporum cohæsiorem tollendam, illa autem vim reagentem æqualem supponat; nullus sane de existentia vis, qualiscunque sit, in cohærentia corporum dubitabit.

### §. IX.

Omnia corpora, quando sese immediate contingunt, sibi adhærent & cohærent. \*

\* Est hæc propositio empirica & adeo manifesta, vt nemo eam inficias facile sit iturus, hinc nec exempla attuli. Occurrent tamen inferius Spho 10, 12, 13, 15, &c. Cæterum illam heic vt phænomenon h. e. vt rem sensibus obuiam, licet confuse tantum cognitam, adduximus. Hoc tamen monendum esse duximus, nosmet loqui de cohæsiore, quæ rationem sufficientem non habet in artificio; nec in pressione aeris aut alius fluidi corpora ambientis, sed potius de naturali cohæsiore. Dari autem cohæsiorem, quam modo memoratæ causæ haud efficiunt probatum iam ibimus. Si quis est, qui varios modos, quibus cohæsiore fit, cognoscere cupit, is legat Celeb. MVSCHENBROECK egregium *Physicæ compendium*, inprimis eiusdem *Diff. de Cohærentia corporum*, quam *Dissertationibus illius Physico-mathematicis* insertam deprehendes.

### §. X.

Inter causas, quæ corporum cohæsiorem efficiunt, primas tenet aeris terram ambientis pressio. Nemo autem, qui vel limina modernæ physicæ methodice tractatæ salutauit, de pondere aeris dubitabit. Vis autem, qua corpora ex pressione aeris cohærentia separantur, æquiuale



ualere debet ponderi prementi. Quantitas virium prementium optime exploratur obseruationibus barometricis. Quibus etiam experimentum hemisphæriorum Magdeburgicorum satis notum iungi potest.\*

\* In hoc experimento notamus, quod, si illud accurate institui debeat, margines hemisphæriorum non sint obducendi glutine; ex infra dicendis enim patebit, quantum eo augeatur cohæsiō. Vt vero aer arceatur, ne intra commissuram marginum intrare queat, extrinsecus margines crassiuscule obducendi sunt cera aliaue re. Hoc modo experimentum cum successu eueniet.

### §. XI.

Ex quo aeris pondus a physicis superioris seculi fuit in apricum positum, omnem cohæsiōis effectum aeri prementi adscripserunt. At vero aerem non sustinere vicem causæ vniuersalis probabimus iam iam cohæsiōe marmorum.

### §. XII.

Duobus marmoribus perpolitis & paullulum calefactis sebum illinatur supra ignem carbonum vt sebum probe fluat. Quo facto marmora supra eundem ignem sibi inuicem atterantur. Attritu peracto marmora per sufficiens tempus in loco frigido adseruentur, vt sebum solidescat & omnis, qui potest ignis marmora deferat.\* Postea suspende marmora in vacuo Guerickiano & nulla subsequetur separatio, immo ponderibus ex marmoribus suspensis inuenies decuplo & multo maiorem saepe vim requiri, vt diuellantur, quam aer marmora premens pondere suo exserit.\*\*

\* Quæ in experimento obseruanda sunt, eo tendunt, vt  
1) aer, quantum fieri potest, abigatur ex cavitatibus marmorum atque ex sebo; illius enim, si multum superest intra marmora, non mirum phænomenon mutari; 2) & sic numerus punctorum contactus augeatur, atque vt omnes marmorum cavitates expleantur,



antur; hinc sebum fluat, necesse est, quia frigidum omnibus sese non ita potest accommodare.

\*\* Non me fugit, experimentum cum alio plane euentu institui posse. Quodsi enim sebum frigidum adhibeatur, multum aeris residuum manet intra marmora, qui, quum exteriori elasticitate sit æqualis, hoc ablato, marmorum cohæsiõnem dirumpit. Quodsi attritus accedat exiguus, permultum sebi inter marmora remanet, hinc plurimus contactus tantum est inter particulas sebaceas, quarum cohæsiõnem aere remoto, vel solum marmorum pondus, aut exiguum pondus iis adpensum, superare potest, id quod etiam cel. WOLFFIUS in *phys. experim. tom. I. cap. 5. §. 114. p. 250. sq.* obseruauit. Acutissimus MVSCHENBROECKIUS in *dissert. phys. p. 460.* ideo corpus intermedium semper liquefecit & attritu bene peracto corpora coniuncta refrigerio deinde commisit, horamque expectauit, donec frigus æquale ac ante in corporibus obseruauit.

### §. XIII.

Modo laudatus Cel. P. v. MVSCHENBROECK singularem etiam conscripsit dissertationem de *coherentia corporum firmerum*, vid. *Dissert. phys. mathem. p. 434. sq.* lectu omnino dignissimam. Quæ quum ita sit comparata, vt multa huc spectantia & antea dicta corroborantia contineat, non possumus committere, quin illa paucis hic delibemus. Inter modos autem, quibus cohæsiõ corporum obtinetur, refert etiam illum, quo corpora duo solida, intermedio alio molli; sed tamen solidi naturam postea induente corpore coniunguntur, veluti ligna intermedio glutine, lateres calce, metalla mediante alio facilius liquescente, duo marmora sebo interposito. Postremum vero experimentum sollicitius inquisiuit. Varia autem corpora adhibuit solida variaque interposuit mollia, cohæsiõnisque differentiam diligenter obseruauit, quas obseruationes sequenti tabula conspiciendas sistimus, cuius columna prima exhibet corpora interposita  
secun-



secundum grauitates specificas ; altera sistit vim , qua duo vitra cylindrica cohæserunt , quorum superficiei cohærentis diameter fuit  $\frac{3}{4}$  pollicis Rhenol. Tertia columna vim cohæſionis duorum cylindrorum ex flauo cupro fabrefactorum , obseruatam inuenies , quorum bases fuerunt planæ ac læuigatæ ; non tamen vsque ad splendorem. Quarta denique duorum cylindrorum ex marmore albo confectorum , quorumque bases erant planissimæ & diameter æqualis  $2\frac{1}{12}$  poll. Rhenol. vis , qua cohæserunt , adnotata est :

I.	II.	III.	IV.
Pix nigra vulgaris	= 850. lb	1400. lb & vltra	1250. lb
Cera	= 230. lb	900. lb	900. lb
Colophonia		850. lb	
Sebum	= 298. lb	800. lb	
Aqua	= 9. Vnc.	12. Vnc.	6. Vnc.
☉☉ Raparum	= $8\frac{1}{2}$ . Vnc.	18. Vnc.	$15\frac{1}{2}$ . Vnc.
☉☉ Therebinth.		24. Vnc.	
Cohæſio sine corpore intermedio	= $1\frac{1}{2}$ . gran. Med.	2. gran:	

Pressio atmosphæræ in maximam horum cylindrorum superficiem vix æquabit 50. lb ; multo autem maiori vi cohærent. Quodsi pressionem aeris in datam superficiem calculo eruere libitum sit , facili id peragi potest negotio. Pollex enim cubicus mercurii æqualis est ex calculo Cel. MVSCHENBROECKII 8. Vnciis , 6. dr. & 8. granis & maxima barometri altitudo est 30. pollicum. Iam data basi corporis inueniri potest cylindrus mercurii eiusque pondus : huic vero pressio aeris est æqualis.

#### §. XIV.

Sequentia heic adnotabo 1) quo maior visciditas ac densitas corporis interpositi ; eo maior est cohæſio, hinc pici succedit cera, huic colophonia & huic sebum &c. 2) non diffido, fore, vt crescente corporis fluidi specifica



fica grauitate, crescat quoque corporum cohæſio. Non mirum, cohæſionem ex aqua eſſe leuiſſimam, illa enim fluida ſemper exiſtit; nec ſoliditatem induit niſi frigore. Ceterum legem illam in reliquis obſeruabis. Differentiæ exiguæ facile occurrere poſſunt, eo quod in modo compositionis, ſi vel tantillum peccetur, cohæſio ſtatim variabit. Concurrit etiam ſtatus aeris externus, hinc Excell. D. HAMBERGERVS obſeruauit, hieme maius pondus adhibendum eſſe, vt ſeparentur, quam æſtate. Aëſtate enim corpora omnia ſunt calidiora quam hieme; ignis vero efficit, vt corpus interpoſitum eundem duritiei gradum non adquirat, quem in hieme habet.

#### §. XV.

Ex his experimentis euidentiffime liquet, corporum cohæſionem in immediato contactu multo maiorem eſſe pondere atmophæaræ prementis. Niſi ergo effectum cauſſa ſua maiorem ſtatuas, fatendum omnino eſt, cauſſam cohæſionis corporum vniuerſalem non eſſe aerem. Si quis autem eſſet tantæ pertinaciæ, vt in his acquieſcere nolit, in illius gratiam ex ſuperſuo ſubiungimus cohæſionem duorum ſolidorum, quæ AMONTONſIO, digniſſimo olim ſocietatis regiæ ſcientiarum in Gallia florentis membro, caſu obuēnit. vid. *Memoires de l'acad. roy. des ſciences*, M D C C I V. p. II6. ſqq. edit. Amſtel. Hic nouum meditando operculorum genus, *ventil* dictorum, in conum incidit truncatum, quem ex metallo paratum ac perpolitum matrici ad eandem figuram excavatæ ſimiliterque politiffimæ inferuit, exiſtimans, hac ratione omnem aquæ, ſemel ope emboli eleuatæ, reſuſum intercluſum iri, ſi quidem conus truncatus recidens foramen exactiffime clauderet. En vero aliud præter opinionem animaduertit. Conus enim tam arcte firmiterque matrici inhæſit, vt non niſi magna vi, euelli ruſus potuerit. Aderat autem, embolo ſuſum eleuato ſpati-



spatium ab aere vacuum intra conum & embolum, & ex consequenti nulla aderat resistentia aut pressio ex parte aeris: contra inferiorem coni partem magna vi agebat aqua pressione aeris adscensura, sed frustra. Alio modo conus non sine magna vi rursus erat extrahendus. Hoc sane exemplum tanti iudico esse roboris, ut omnes oppositiones ex pressione aeris depromptas retundere satis queat.

## §. XVI.

Nunc aliorum adhuc nobis discutiendæ essent sententiæ, qui causam cohesionis extra corpus existere statuunt, inprimis pressio ætheris, quam celeberrimi præcipue duumui, MALEBRANCHIUS in *tr. de inquirenda veritate* & IAC. BERNOVILLIUS in *tr. de gravitate ætheris* stabilire connixi sunt. At vero quum doctrinam hanc, veluti hypothesin haud demonstratam, acutissimi plerique physicorum ex hodierna physica eliminarint, non necessum duco, ei refellendæ diu immorari. Lectorem potius ablegamus ad cel. MVSCHENBR. *dissert. cit.* in qua solide ostendit doctrinam illam non respondere phænomenis. Cohæsiō enim sequi deberet rationem gravitatis; experientia autem aliud docet, & eadem causa iisdem positis circumstantiis contrarios plane effectus edere deberet, quod tamen absurdum est. Et si libet, adeas etiam Excell. D. *Præsidis Element. physicæ* caput tertium, quo demonstrat, ex adsumto subtilissimo eiusmodi fluido sequi potius solutionem, quam cohesionem corporum. Aliorum opiniones veluti communi consensu hodie reiectas ne recensere quidem libet.

## §. XVII.

Præter aerem & ætherem nihil superest extra corpus, ex quo cohæsiō concipi possit. Causa itaque vniuersalis aut in ipso corpore; aut in corpore intermedio residere debet, id quod duo solida quasi conglutinet.



## §. XVIII.

Videamus, num in corpore intermedio sola sit co-  
hæſionis cauſſa. Hoc vero exigua quantitate intereſt in-  
ter corpora, nec aliud quid, quantum cognoſci poteſt,  
præſtat, niſi quod defectum contactus ipſorum ſolido-  
rum ſuppleat. Particula vero intermedia vtraque ſua  
extremitate cum particulis ſolidi cohæret, in medio  
ſecum ipſa cohæret. Prout vero particulæ grauitate  
ſpecifica differunt, differunt numero punctorum con-  
tactus: \* grauior enim particula plures habet eam  
componentes & adhærentes, quæ maiorem efficiunt  
cohæſionem, id quod poſtea clariuſ euadet. Hinc  
quo grauius fluidum interponitur; eo maior eſt nume-  
rus punctorum contactus atque eo maior cohæſio. Ni-  
hil itaque peculiare inuenire licet in particulis cor-  
poris intermediæ, niſi ramulos vncinuloſque fingere ve-  
lis, quibus particulæ præditæ ſint, qui ſeſe intricantes  
cohæſionem efficiant; quod tamen eſt chimæra.

\* Cel. MVSCHENBROECK. *l. c.* diuerſitatem cohæſionis ex  
diuerſa figura particularum corporis intermediæ deducere adla-  
borat, quæ, ſi figuris cavitatum corporis ſunt ſimiles, has ex-  
acte explent, ſicque attractio in maiori punctorum contactus  
numero maior exiſtit. Quod quidem ſi ſic ſe habet, ratio inde  
omnino etiam reddi poteſt diuerſæ cohæſionis. Scio, eſſe alios,  
qui hanc rem ſic ſe expedire geſtiunt. Adferunt exemplum me-  
chanicum. Notum enim eſt, bacillos longiores faciliuſ frangi  
breuioribus, & quo hi ſunt breuioreſ; eo difficiliuſ franguntur.  
Iam ſebum inter marmora contentum ſibi repræſentant tamquam  
inſinitam bacillorum minimorum congeriem, qui iunctim ſummi  
maximam exſerunt vim in continendis marmoribus, hinc adeo  
difficulter marmora ſeparantur. Huic autem ſententiæ addi-  
ctos valde rogo, velint rem paullo curatius penſitare, vt ne opi-  
nionis errore decipiantur. Quid enim horum bacillulorum co-  
hæſionem cum marmoribus efficit? Nonne ſponte deuenien-  
dum ruruſ eſt ad id, quod petebatur?

## §. XIX.



## §. XIX.

Nihil itaque superest, in quo causam cohesionis quaeramus, nisi ipsum corpus. Quum autem nihil ratione sufficiente sit destitutum, statuendum omnino est, causam, cur corpora cohaereant, habitare in ipso corpore. Ex dictis etiam abunde patet, corpora non nisi in immediato sui contactu cohaerere; in idea autem contactus nihil latet, ex quo cohesio intelligi queat. Contactus itaque immediatus erit solum conditio sine qua non. Vt vero omnium virium motricium confusam tantum habemus notionem, summis philosophis ingenue id fatentibus; ita nemo etiam a nobis distinctam vis cohesionis explicationem postulare poterit. Vt phaenomenon tantum nosmet illam naturæ legem intuemur.

## §. XX.

Licebit nunc leges nonnullas cohesionis condere, quas & ratio suppeditat & experientia confirmat. Consequitur autem sponte, vt quo maior sit summa virium; eo maior sit effectus ex illis productus. Vim autem animaduertimus in immediato contactu se exferentem. Quo maior itaque numerus punctorum contactus, eo maior adest virium summa, eo maior consequenter cohesio. Quo maiora itaque sunt plana sese contingentia, eo maior eorum existit cohesio.

## §. XXI.

Gravitas specifica maior ostendit maiorem particularum multitudinem adesse in eodem spatio, & corpus grauius minus porosum esse leuiori. Quo pauciores & minores adsunt pori, eo plures adsunt particulae in superficie, quæ cum aliis sese contingere possunt. Duo itaque corpora, leuius & grauius, cum alio tertio coniuncta, inæqualiter cum hocce cohaerebunt: maiori vi grauius, minori specificè leuius. Vnde generalem iterum formare licet regulam: quo grauiora sunt corpora, eo



maior cohæsio eorundem in immediato sui contactu. Quæ aliam adhuc continet, nimirum: quò minor est differentia ratione grauitatis specificæ inter corpora sese contingentia, eo maior est cohæsio; & contra. Si corpora sunt specifica grauitate æqualia, differentia adest nulla: cohæsio igitur erit maxima, quæ quidem esse potest pro grauitate specifica maxima.

### §. XXII.

Asperitates tamen, quum immediatum contactum superficierum sese contingentium admodum impediunt, sequitur, vt, quo maior adest planities in superficie corporis, eo maior sit numerus punctorum contactus, eo maior consequenter cohæsio. \*

\* Vid. MVSCHENBROECK. *dissert. cit.* p. 453. Multorum sane phænomenorum ratio ex his regulis peti potest.

### §. XXIII.

Generatim hætenus per experimenta & ratiocinia legitime, vt nobis persuasum quidem est, inde deducta in cohæsionis existentiam, leges ac causam, licet remotiue postremum tantum sit factum, inquisiuius. Iam vero nostrarum partium esse ducimus, vt ostendamus, quænam corpora cohæreant; aut quæ cohærere possint. Corpora autem sunt vel solida; vel fluida. De solidis nulla adest experientia, quæ hanc labefactet regulam, quod corpora solida omnia dato immediato eorum contactu cohæreant. De fluidorum cohæsione cum solidis & de fluidis cum fluidis eadem omnino valet regula. Quum tamen experientia aliud ostendere videatur, inuestiganda erit ratio huius contrarietatis adparentis. Antequam vero illud facere possumus, in medium proferendæ erunt regulæ, quas experientia hac in re suppeditat. Quum vero Excell. D. *Præses* in *physica* sua fusius hanc rem tractauerit, breuiores in hac  
erimus,



erimus, ea tantum, quæ fini sunt conuenientia, solum allaturi.

#### §. XXIV.

Bacillo ex quocunque solido parato mundo contingatur paullulum superficies aquæ; aut alius cuiusuis liquoris solido specifica grauitate inferioris: facto contactu vel leuissimo bacillus lente ad distantiam exiguum eleuetur & adparebit monticulus liquoris supra libellam illius adsurgens cumque bacillo connexus.

#### §. XXV.

In locum horum liquorum substituas mercurium & in locum solidi metalla, excepto ferro, aut etiam gemmas particulas metallicas commixtas habentes & idem obseruabis phænomenon.

#### §. XXVI.

E contrario fume mercurium & corpus non metallicum & contrarium plane animaduertes. Mercurius enim non solum non cohærebit cum ligno; aut alio corpore non metallico; sed interuallum adeo inter lignum & mercurium conspicietur a latere.

#### §. XXVII.

Generalem horum phænomenorum regulam ex inductione stabilituri, attendendum nobis est vi regularum logicarum ad illud, quod phænomenis est commune. Sunt vero corpora ipsa solida & fluida & ratione grauitatis specificæ discrepantia. Plura sub similibus phænomenis similia, sub diuersis dissimilia, in sensus non incurrunt. Ex §. 24. & 25. itaque hæc sequitur regula generalis:

- 1) Fluida quæcunque adhærent solidis specificè grauioribus.\*

\* Regulam hancce vnicam totidem fere verbis habet Cel. NIEWENTYTIVS, doctissimus sane ac pius insimul physicus, quam ipsius verbis ex opere eius physico præstantissimo, cui tit. *demon-*



*demonstration de l'existence de Dieu, L. II. c. 4. p. 244.* transcribimus: On observe que certaines substances peuvent s'attacher & s'unir a d'autres substances qui pesent davantage; ceci se voit dans la plûpart de liquides, qui adhèrent & s'attachent a d'autres substances plus pesantes.

Ex §pho 26. altera deducitur:

- 2) Fluidum quodcunque corpori solido specificè leuiori non adhæret.

### §. XXVIII.

Faciamus nunc periculum, vtrum rationem harum regularum eruere possimus. Quodsi fluidum contingit solidum specificè grauius, nihil cognoscimus, nisi quod in grauiori maior adsit particularum quantitas in eodem volumine vbicunque autem maior adest numerus punctorum contactus, ibi maior est adhæsiō (§. 20. 21.) In corpore contra fluido specificè leuiori minor est materiæ copia sub eadem magnitudine, minor consequenter cohæsiō. Quodsi itaque fluidum contingit grauius, in pluribus punctis hocce tanget, quam quibus ipsum cohæret fluidum: contactus in pluribus punctis efficiet cohæsiōnem maiorem. Ratio itaque maior adest, cur fluidum solido specificè grauiori adhæreat fortius, quam inter se ipsum cohæreat. Ergo si contingit actu adhærebit & cohærebit fluidum cum solido specificè grauiori (§. 27. num. 1.)

### §. XXIX.

Fluidum specificè grauius si contingit solidum specificè leuius, adhærere quidem debet, sed quia adhæsiō in perpauca fit punctis, plane non erit sensibilis. Fluidum enim grauius maiorem massam continet sub dato volumine, quam solidum leuius (§. 4.) consequenter maiorem exercet vim cohæsiōnis cum se ipso, quam exferere potest, si corpus solidum tangit, heic enim minor adest numerus punctorum contactus, quam in ipso fluido:



fluido. Quo maior enim est differentia grauitatum specificarum solidi & fluidi, eo minorem numerum punctorum contactus solidum exhibet fluido, & eo minor ex consequenti est cohæsiō fluidi & solidi cohæsiōne partium fluidarum inter se. (§. 21.) Quod si igitur fluidum eiusmodi a solido separatur, nullæ partes fluidi solido adhærentes remanere possunt, vis enim alioquin minor maiorem superare deberet, quia vis cohæsiōis fluidi & solidi leuioris partes fluidi adhærentes a reliquis particulis separare deberet; harum autem cohæsiō maior est inter se, maior itaque est vis cohærens, quam separans. Omnia itaque phænomena, quæ maiorem saltem æqualem vim illi, quæ est inter particulas fluidi cohærentes, requirunt, aliter sese habebunt. In experiētiis autem physicis sensus tantum determinant quid sit quidue non sit, ergo si secundum experiētiā loqui volumus, dicendum est, fluida grauiora cum solidis specificè leuioribus non cohærere.

## §. XXX.

Obiectio quidem formari posset contra hasce regulas, siquidem mercurius metallis specificè leuioribus adhæret, nisi supra iam monuissemus (§. 3-5.) esse in metallis partes totum constituentes, quæ mercurio sunt specificè grauiorē, eo quod hæcce metalla mercurio imprægnata in hoc fundum petant; hinc etiam mercurius his adhæret. Quoniam autem aurum magis quam reliqua metalla mercurio est specificè grauius, fortius etiam hic cum eo cohærebit, quam cum reliquis metallis. Et generatim dicendum est, quod quo plures particulas metallicas solidum, cui mercurius adhæret, commixtas habet, eo fortius hic illi adhærebit.

## §. XXXI.

Fluidi specificè leuioris gutta ita iuxta fluidi specificè grauioris guttam collocetur, vt hanc contingere possit & illa huic illico adhærebit atque eandem circumdabit



bit. Hinc regula iterum generalis de adhæsione fluidorum enascitur: Fluidum nempe specificè leuius adhæret in contactu fluido specificè grauiori. Cuius rei ratio manifesta est ex §pho 28. Eadem enim subest, quæ inter corpus fluidum specificè leuius & solidum specificè grauius intercedit, si fluidum specificè grauius substituatur in locum solidi. Fluidum enim non adhæret solido quatenus est solidum, sed quatenus est corpus specificè grauius fluido: quod æque in alio fluido ac in solido esse potest.

### §. XXXII.

In præcedentibus semper asseruimus, cohaesionem crescere cum grauitatibus specificis corporum cohærentium crescentibus. Quod quidem verum omnino est, dummodo alteram conditionem immediati contactus non omittas. In diiudicanda igitur cohaesione semper est attendendum (1) ad grauitatem corporum & (2) ad contactus quantitatem. Etenim aurum purum multo est specificè grauius ferro, illius tamen cohæsiō minor est cohæsione ferri, illud enim admodum est friabile & flexibile, hoc non item. In contactus igitur quantitate rationem differentię quæras necesse est, atque dicendum est, auri particulas minimas esse sphaericas aut saltem sulphure subtilissimo ita vndique cinctas, vt cohæsiō auri non tam fit inter particulas metallicas ipsas quam potius inter particulas illas ambientes; ferri autem particulas a figura sphaerica magis recedere atque ideo in pluribus punctis sese contingere & fortius cohærere.

### §. XXXIII.

Ex cohæsione fluidi cum alio corpore, primo cohæsiōnis momento, fit motus fluidi versus istud, quo cum cohæret. Etenim (1) guttulæ fluidorum, corporibus impositæ, quibus non adhærent, seruant figuram sphaericam. (vi exper.). (2) Hæc figura ex pondere guttulæ intelligi nequit, immo potius huic figuræ pondus est



est contrarium, ex pondere enim omnes partes corporis descendunt deorsum tantum quantum possunt, id quod in figura sphaerica non est. (3) Ergo, quum tertia vis non adsit, hæc figura dependet a cohesione partium. (4) Ergo, cum quies adsit, manet enim figura sphaerica, & cohesio tamen sit vis seu tendentia (§. 9.), vt vires directo oppositæ sint æquales in tali guttula necesse est, h. e. particulæ in dextra guttulæ superficie positæ tendunt versus sinistram, & partium in hac superficie positarum tendentiæ dant æquilibrium; & contra: simili modo inferiores guttulæ partes tendunt versus superiores & harum tendentiæ dant æquilibrium; & contra. (5) Ergo, ex duabus tendentiis, quæ sibi inuicem dant quietem, vna per nouam tertiam sublata vel imminuta, altera dabit motum secundum directionem quam ante æquilibrium sublatum obtinebat, nisi quartum impediens adsit. (6) Sit corpus A & B, agant in se inuicem ita vt sibi mutuo resistant, accedat tertia vis, quæ in corpus A agat siue quod idem, quæ corpus A determinet secundum directionem contrariam & tanto minus aget corpus A in B, i. e. tanto minus corpus A resistet corpori B, quanto maior est actio tertiæ vis, nisi vis corporis A versus B simul augeatur. (7) Particulæ v. g. dextræ guttulæ cuiusdam si continguntur ab alio corpore accedente cui adhærent, determinantur secundum directionem, isti, qua in guttulam agebant, contrariam (§. 9.), ergo tendentiæ particularum in sinistra guttulæ superficie positarum (n. 4.) non amplius resistunt (n. 5.) ergo particulæ sinistræ guttulæ dabunt motum (n. 6.), h. e. mouebuntur versus corpus contingens. \*

\* Magni hic paragraphus est momenti, siquidem in sequentibus sæpe numero ad illum prouocamus. Exemplum globulorum aquæ innatantium atque ad latera vasis tendentium egregie illum confirmat atque ob oculos clarissime ponit. Globulorum enim gravitati æqualis resistentia datur ab aqua inferiori, hinc gravitas



impedimento non est, quin effectus debitus consequatur. Simulac itaque globulo ex vna parte plus aquæ adhæret, actio globuli versus hancce partem maior euadit & actualis etiam tendentia, id quod infra suo loco fufius explicabimus. Leges motus, quibus hæc demonstratio innitur, vtpote cognitæ fupposuimus; non enim omnium principiorum ac terminorum adhibitorum longam tractationem inferere potuimus, tum enim plura physica, mathematica & multa alia fuissent explicanda. Multorum etiam phænomenorum ratio ex præmissis statim subiungi potuiffet, nisi illud ad fequentia referuaffemus. Pedem itaque nunc promouemus ad explicationem doctrinæ attractionis illiusque examen.

#### §. XXXIV.

Antequam vero ad ipsum examen accedimus, breuem huius doctrinæ per antiquæ hiftoriam præmittere non inutile vifum est. Hippocrates eiusque commentator Galenus vim attractricem inprimis in explicanda œconomia corporis adhibuerunt. Quos quum euoluere mihi non licuerit, illa adferam loca, quæ DAN. KEILLIVS, Ioannis frater, medicus egregius, in *præfat. tentaminibus physico-medicis* præfixa, ex illis adducit. *Hippocrates in tr. de nat. hom. de medicamentis differens, επειτα δε, inquit, και παλλα ελκει τε και καιθαιρει.* Et *Galenus in commentar. in Hippocr. εξευρωμεν μεν εν κοινη πως ελκεται. πως δε αλλως η ως σιδηρος υπο της Ηρακλειας λιθου, δυναμιν εχουσης ελκτικην τοιαυτης ποιότητος*: sensus breuibus hic est, quod attractio fit vis quædam vniuersalis, omni materiæ inhærens, nec potentia magnetis ferrum ad se trahentis dissimilis. In altero libro de naturalibus facultatibus contra Epicurum aliosque illius possibilitatem & existentiam propugnat. His locis expresse subiungit cl. KEILLIVS *l. c.* hæc verba: Ex his patet, hanc minutarum particularum materiæ attractionem non hodiernum esse commentum; sed a veteribus olim receptum & ab illis ad nos deriuatum, conf. *Mr. le Clerc hist. de la Medic. Part. I. L. 3. c. 2.*

Post-



Postquam autem vis attractiua vna cum reliquis veteris scholæ occultis qualitatibus ex philosophia esset profligata, postliminio quasi a cl. IO. KEILLIO summi Newtoni auctoritate & titulo in eam reducta est. Celeb. NEWTONVS primus inter recentiores hac voce vsus est in *princ. philos. natur.* & sub intelligit grauitationem corporum cælestium versus commune centrum, cuius hanc legem dedit, quod sit in inuersa ratione quadratorum distantiarum. Nullibi autem in hoc opere illa voce actionem corporum in distans nullo corpore intermedio intellexit; sed monet, quod plane in dubio relinquat, vtrumne illa attractio fiat impulsu.

Postea autem KEILLIVS, mathematicus insignis, eo progressus est, vt in nostro quoque globo terraqueo similem corpusculorum tendentiam ad se inuicem adserere auderet. Ipsius verba hac de re hic apponimus: *in eam tandem*, inquit, *cogitationem incidi, principium quoddam Newtoniano non absimile, ad phænomena terrestria explicanda adhiberi posse.* Post iterata sæpius experimenta materię inesse deprehendi vim quamdam attractricem. Addit: *post communicationem cum Newtono factam hunc idem se iam animaduertisse, dixisse, eumque in finem quæstiones quasdam optice suæ subiunxisse*, vid. *Act. erudit. Lips. Supplem. tom. IV. sect. VI. p. 273.* it. IO. KEILLII *introduc. ad veram physicam & astronomiam*, edit. s' Grauesandii, qui Keillii theorematata de attractione huic editioni subiunxit. Postremum est quidem verum, at quæstiones cel. NEWTONI legenti patefiet, eum nullibi pro certo illam amplexum fuisse; sed semper incertum mansisse. Quærit enim continuo, annon eiusmodi quid sit; aut esse possit; non autem definit, quod sit. Hinc etiam cl. D. VERDRIES, inclytus Giessensium philosophus ac medicus, in *physicæ suæ parte gen. c. IV. §. 9. p. m. 116.* locis ex Newtono adductis male eos agere ostendit, qui Newtonum, patronum sententiæ suæ adsciscunt. Quod



etiam cel. WOLFFIVS in *opere cosmol. lat.* facit, dum attractionem Newtoni ab illa, quam KEILLIVS aliique tradunt, discernendam esse iudicat.

Ex his itaque elucet, KEILLIVM esse auctorem principii attractionis. Plurimos statim tum sua; tum Newtoni auctoritate in suas pertraxit partes. Ex quibus scriptis illud illustrare conati sunt, maxime IAC. KEILIVS, FREINDIVS, MORGANVS aliique. Clarissimam autem lucem huic doctrinæ affundere enixi sunt cel. S'GRAVESANDIVS & cel. P. V. MVSCHENBR. ille in *Elementis physicae Newtonianis*; hic in scriptis suis iam citatis.

### §. XXXVI.

Ad definitionem quod attinet, omnibus fere est eadem, nempe quod vis attractiua sit potentia omnibus materiæ particulis insita, qua sua sponte ad se inuicem accedunt duo corpora distantia. Breuibus: est mutuus duorum corporum distantium accessus sua sponte.

### §. XXXVII.

Sequentes propositiones in hac definitione contentas seorsim subiungere vtile nobis videtur:

I. Vis attractiua est lex naturæ vniuersalis, eo quod omni competit materiæ. Hinc cel. P. V. MVSCHENBR. in *præfat. diff. de magnete p. 3.* attractio, inquit, a nonnullis lex vniuersalis naturæ habetur, quæ omni corpusculo infusa solido (fluidis non exclusis) numquam destruitur; sed in eo semper manet, quemadmodum grauitas indita a creatore omni materiæ, proportionalis est massæ, peritque aut silet numquam.

II. Vis attractiua est vis in distans agens.

III. Actio duorum corporum in distans est mutua atque reciproca.

IV. Attractio non prouenit ex impulsu corporis externi; sed ratio est in ipsa corporis materia.

### §. XXXVIII.



## §. XXXVIII.

Ultimam hancce propositionem, vtpote, quæ causam indicat, & in qua omnis rei cardo vertitur, maximo studio vt probent, elaborarunt viri celeberrimi. Inprimis cel. P. V. MVSCHENBR. *dissert. phys. math. dissert. de Tubis capillaribus*, p. 326-332. multas a multis allatas reiicit causas. Experimentis enim demonstrat, nec aerem; nec ætherem; nec fluidum ipsum; quatenus premit, nec aliud quodcumque corpus adsumtum causam esse posse adscensus fluidorum in tubis capillaribus. Omnibus itaque reiectis, vim attractiuam reciprocam vitri & aquæ, causam esse infert. In *elem. tamen physicæ* M DCC XXVI. in 8. editis, compendio sane præstantissimo, impulsum non impossibilem esse admittit, hinc impulsum incognitum, attractionem vocari posse censet, immo in ignorance causæ, ex qua hic motus & accessus mutui proficiscitur, rationem quarit, cur hicce motus ab alio ex impulsu cognito proueniente sit distinguendus nomine peculiari. Et cel. SGRAVES: l. c. *huius*, ait, *motus causa nos latet*; non tamen negat, impulsu locum habere posse; nec desperat de causa hacce aliquando detegenda. Et licet in effluuiis corporum principium agendi hære posse, non negent; nihil tamen accurate determinant. A'io significatu sese illa voce haud vti studiose moneant, quam quod illa phænomenon mutui accessus denotent. Omnibus etiam viribus obnituntur, vt ne qualitates occultas sese adserere, quis credat.

## §. XXXIX.

Non autem subsistunt viri celeberrimi in phænomeno generali; sed ex illo speciales regulas deduxerunt. Has itaque leges Attractionis ordine recensere animus est:

*Reg. I.* Corpora distantia mutuo se attrahunt & hinc ad se accedunt.

*Reg. II.*



*Reg. II.* Attractio subito decrefcit fimulac diftantia eft fenfibilis. Rationem decrementi & diftantiae ob defectum experimentorum determinare non audent. cl. KEILLIVS tamen l. c. adferit, vim attractiuam decrefcere in maiori, quam duplicata ratione diftantiae augfcantis. Num vero fit triplicata; aut quadruplicata non definit. Cel. MVSCHENBR. in *epit. phyf.* pro varietate affumtae hypothefeos variam refultare proportionem oftendit. Si enim attractio fit per radios quali exeuntes ex centro fphaerae, poteft in diftantiis tribus debilitari modis, vel

1) imminuta radiorum agentium copia, tumque erit in ratione triplicata inuerfa diftantiarum; vel

2) quod radii agant eo debilius, quo funt a centro fphaerae remotiores; vel

3) vtroque modo fimul. Si radii manent aequae fortes per totam longitudinem, attractio erit, vt lex grauitatis, in ratione inuerfa quadratorum diftantiarum.

Omnes itaque conueniunt, vim attractiuam non efle fenfibilem in diftantia fenfibili; miror ergo cel. P. v. MVSCHENBR. poftea in *difsert. de tubis capill.* p. 287. mentem mutaffe. Inueni, inquit, vim attractiuam fefe exferere ad diftantiam  $1\frac{1}{2}$ . pedis Rhenol. & vltra.

*Reg. III.* In diftantia infinite exigua, h. e. in ipfo contactu immediato attractio eft maxima.

*Reg. IV.* Quo plura adfunt puncta; feu partes fefe contingentes, eo maior eft attractio, & eo maior confequenter corporum cohaefio. Quare tum cohaerentia eft maxima, fi fuperficies corporum fe contingentium eft plana & polita. Cohaefio enim eft quantitati contactus proportionalis. Hinc fluiditas oritur, fi contactus particularum funt pauciffimi, quales funt in corpusculis fphaericis & infinite exiguis.

*Reg. V.* Si diftantia corpusculorum fit paullo maior, attractio non tantum euanefcit; fed fit adeo repulfio, qua  
vnum



unum corpus alterum fugat. Quantum mihi mentem virorum clarissimorum adsequi licuit, per repulsionem intelligunt vim corporibus insitam, qua a se inuicem recedunt. Attractiuæ ergo vi opposita est repulsiva. Vtraque inest corpori simul; repulsiva autem agit tantum in distantia maiori corporum & cel. MVSCHENBR. l.c. expresse dicit, quod repulsio agat in maiorem distantiam, quam attractio.

## §. XL.

Exhibui præcipuas regulas attractionis, specialiores nonnullas legesis in cl. KEILLII theorematibus l.c. Quas omnes quum experiētiis inniti & sensibus manifestari perhibeant, allatæ experiētiæ examini iam sunt subiiciendæ. Permultæ quidem ab iis adferuntur experiētiæ & experimenta, quæ si cuncta percurreremus, numerus plagularum definitus non sufficeret. Illa itaque examinabimus, quibus ipsi maximum inesse credunt robur, quæque maxime vrgent. Antequam vero ad examen accedimus, est adhuc, quod in exemplis adductis desiderare licet, nimirum quod

1) ea in subsidium aduocent, quæ, ex consensu philosophorum omnium, soluta sunt difficillima, veluti Magnetem & corpora electrica. Ipse etiam cel. MVSCHENBR. in *præf. dissert. de Magnete*, coactus est, discrimen facere inter vim attractiuam omnibus corporibus communem & illam, quæ magneti est peculiaris. Quum enim vim magneticam igne destructibilem esse cerneret; legis autem naturæ destructionem admittere, saluo manente corpore, temerarium iudicaret, non alio effugio, nisi hac distinctione, elabi se posse credidit. Corpora vero electrica talia non sunt, nisi sub circumstantia frictionis & quidem fortioris. Quodsi itaque accessus filamenti straminei ad corpus fricatum & accessus globuli aquæ innatantis ad parietes vasis ex eadem causa procedunt, eadem etiam adsunt conditiones, sunt autem



diuersæ. Et finge in corporibus electricis vim attractricem adesse; conclusio tamen inde resultaret particularis, & non esset lex vniuersalis:

2) Plurima experimenta sint eius indolis, vt multis circumstantiis sint inuoluta. Experimentorum vero regula non sane vltima est, quod debeant esse plana ac perspicua & paucissimis aliis implicata & circumdata aliis phænomenis. Hinc iure meritoque experimenta chimica silentio præterimus.

#### §. XLI.

Duo plana vitrea siccaque sibi mutuo imposita, manifestam produnt \* cohæsiõnem.

\* Recte illud omnino inde infertur optimeque conuenit cum superioribus (§. 9. sq.), sed nulla inde inferri potest attractio; seu actio in distans (§. 36.) adest enim immediatus contactus.

#### §. XLII.

Bacillus &c. vide hoc experimentum descriptum §. 24. hinc deducunt attractionis propugnatores, quod vitrum; aut aliud quodcunque corpus liquorem eo vsque attollat, donec vis attrahens corporis immersi minor euadat grauitate & vi attractrice aquæ inferioris. At vero nosmet non egere attractione, sequens solutio ex regulis cohæsiõnis deriuata ostendet: si solidum specificè grauius aquam contingit, hæc ei adhæret (§. 27.) & quidem fortius, quam aqua inter se cohæret (§. 21.). Quod si bacillus lente & ad exiguam distantiam rursus extrahitur, quæritur, num aqua cohærens manere cum solido & a reliqua aqua separari, & vbi hæc separatio fieri debeat. Quoniam aqua solido specificè grauiori adhæret fortius, quam aqua inter se cohæret: aquæ cohæsiõ secum ipsa vtpote minor cohæsiõnem fortiorem tollere nequit, ergo particulæ adhærentes cohærentes manebunt. Porro quum aquæ cohæsiõ inter se in tota massa sit æqualis, aqua inferior cohærebit etiam cum particulis solido ad-

hæren-



hærentibus (§. 27.); idque eo vsque, donec, vis cohæsionem aquæ superans, accedat. Per experientiam autem patet, in quantitate aquæ pîso maiori pondus aquæ maius esse sua cohæsione: aqua igitur eo vsque adscendet & cum aqua baculo adhærente cohærebit, donec pondere aquæ cohæsio rumpatur. Quare in viscidis nexus inter solidum & fluidum longior est, adest enim cohæsio maior. In mercurio autem illud non succedit, si solidum est specificè leuius illo: simile autem phænomenon adparet, si corpus est metallicum. Nulla itaque vi attractiua indigemus, nisi præter necessitatem noua fingendi sit animus.

### §. XLIII.

Si solidum specificè leuius immergatur fluido specificè grauiori: interuallum exiguum obseruatur inter solidum & fluidum & figura fluidi est conuexa. Trium phænomenorum iam ratio reddenda est: 1) quare fluidum non adhæreat solido, quod supra iam præstitum est (§. 29.) 2) quare fluidum ne contiguum quidem maneat solido immerso, 3) quare sub sphærica conuexa recedat figura. Alterum, quod attinet, ex legibus quidem hydrostaticis sibi relictis contactus fluidi proximus cum solido & cohæsio, ponderi fluidi solidum prementis proportionata, sequi deberet; sed omnibus notum est, in theorematibus hydrostaticis omnem fluidi cohæsionem, ac si plane non adesset, considerari, hinc ab eo, quod sub conditionibus per abstractionem formatis verum est, ad veritatem physicam non rigoroſe valere consequentiam. Contra quum rotunditas guttularum ostendat, non solum pondus fluidi sub altitudine vnius lineæ Parisinæ circiter, nihil valere contra cohæsionem; sed etiam e contrario, actionem ponderis superari per actionem cohæsionis, sequitur, vt etiam in nostro casu, vbi fluidum non adhæret solido immerso, actio fluidi ex pondere, sub



altitudine circiter vnus lineæ, actionem fluidi ex cohæsione inter se impedire nequeat; atqui ex cohæsione partium fluidi inter se sub altitudine vnus lineæ Parisiensis, sequitur rotunditas conuexa superficiei, in eo loco, vbi alii corpori non adhæret, (vi exper. guttul. §. 33.) ergo, quum eidem actioni, sub eadem altitudine, pondus fluidi resistere nequeat, fiet eadem actio, hinc eadem figura in fluido, si solidum specificè leuius fluido specificè grauiori imponitur; vel immergitur. Adeoque fluidum a solido recedit, idque sub figura conuexa, ex sola cohæsione partium inter se. Quumque ex sola cohæsione partium fluidi inter se hoc phænomenon intelligi queat, entia multiplicantur præter necessitatem, si repulsio ad eius resolutionem adsumitur; immo, quum secundum regulam quintam §. 39. repulsio tunc demum oriri debeat, si distantia corpusculorum fit paullo maior; momento vero immersionis distantia fluidi a solido sit infinite parua, in hoc experimento, etiam secundum leges repulsionis, repulsio locum habere non potest.

#### §. XLIV.

Guttula fluidi specificè leuioris solido specificè grauiori imposita figuram sphaericam non retinet; sed diffuit. Simul ac enim guttula solidum contingit, magis cum hoc cohærebit, quam inter se, (§. 21.) ob prominentias vero corporis solidi guttula sphaerica solidum non continget in vnico puncto, verum in multis simul, hinc figura sphaerica mutabitur & degenerabit in corpus quasi oblongum.

#### §. XLV.

Solidum fluido specificè leuiori si immergatur, fluidum versus parietes solidi, etiam absque remotione solidi a fluido, eleuatum conspicietur supra reliquam fluidi superficiem horizontalem. Idem euenit fluido in vase contento ad latera vasis. Fluidum supra libellam eleuatum repræsentari potest, veluti planum inclinatum figuram  
con-



concauam habens, cuius basis est superficies fluidi reliqui vsque ad parietes vasis continuati, altitudo vero est altitudo fluidi eleuati. Etiam huius phænomeni ratio absque omni attractione explicari potest. Partes fluidi superiores agunt ex cohæsione versus inferiores, quarum distantia a superficie superiori fluidi linea Parisiensi non est maior (§. 33.) & inferiores istæ versus superiores eadem vi, ita vt æquilibrium siue quies ex hac contraria tendentia oriatur, quæ a fluidi pondere superari nequit. (§. 43.) Quando igitur fluidi particulæ superiores continguntur; vel a solido admoto specificè grauiori; vel ab ipsis parietibus vasis, istæ particulæ, quæ solidum immediate contingunt, adhærent solido, (§. 28.) ergo cessant æquilibrium dare vltèrius inferioribus, vel iis, cum quibus ante contactum solidi in æquilibrio fuerant. (§. 23.) Ex actione igitur harum inferiorum fit motus versus eum locum, in quo æquilibrium cessauit, h. e. versus solidum contingens. (§. 33.) Per hunc motum nouæ particulæ fluidi contingunt nouas particulas solidi, quumque istæ fluidi partes ante contactum in æquilibrio essent cum aliis particulis fluidi, etiam hoc æquilibrium tollitur & fit nouus motus versus locum contactus, qui eo vsque continuabit, donec pondus particularum adscendentium æquale sit cohæsioni particularum fluidarum inter se, quantacunque sit cohæsiō fluidi cum solido. Motus enim non fit per vim solidi; sed per æquilibrium sublatum in fluido, adeoque per vim cohæsionis fluidi. Fluidum, quod adscendit, figuram rectilineam triangularem, v. g. exhibere nequit, quia mediæ partes in hypotenusâ trianguli contingunt alias tam in linea horizontali, quam ad horizontem perpendiculari; agunt ergo actione composita versus inferiores oblique, quumque actio ex vi composita maior sit cohæsione partium simplici inter se, mouebuntur istæ mediæ partes fluidi versus inferiores & sic mutabitur linea recta in curuam.



## §. XLVI.

Globuli vitrei concaui, ceracei, aliique in mole leuiiores aqua; quoad particulas tamen specificè grauiiores, ita, vt aqua istis adhæreat, aquæ innatantes in vase mundo, non pleno, accelerato feruntur motu versus latera vasis, seque etiam petunt in medio. Circumstantias nonnullas huic experimento adiciere necessum duco. 1) Si vas est capacius globulusque in medio positus ad quietem redigitur, semper in medio persistet, nec tendet versus parietes. 2) Si globulus in motu constitutus a parietibus ad distantiam circiter dimidii pollicis absit, motu accelerato versus latera ruet: 3) in vase angustiori semper ad parietes tendet. Aqua in ea parte globuli, quæ parietibus est proxima, altior est, quam in opposita, (§. 45.) ergo plures partes aquæ in ista parte adhærent, quam in opposita, hinc maior quoque fit reactio globuli versus istam partem, quam versus oppositam. (Omnis enim actio æqualem habet reactionem.) Tendentiæ igitur versus plagas oppositas in globulo sunt inæquales, sequetur itaque motus, nisi aliud quid ab extra resistat. Istud, quod ab extra resistere deberet, aliud esse haud potest, quam cohæsiō partium aquæ; hæc enim, si motus fieret, foret superanda. Cohæsiō partium fluidarum cum solido, quippe quoad partes specificè grauiore, maior est, quam cohæsiō partium inter se, ergo & reactio globuli, quippe adhæsiōni æqualis, maior erit cohæsiōne partium fluidi inter se, hæc itaque istam superabit & ex consequenti fiet motus. Initio quidem tarde mouebitur; ex successiuo autem incremento adhæsiōnis crescit vis & consequenter motus versus latera successiue fit celerior. Motu itaque accelerato tendet versus latera vasis. Eodem etiam modo ostenditur, cur duo globuli se mutuo petant in medio; sit enim alter latus vasis, alter globus accedens & idem erit phænomenon, licet in eo differat, quod globulus vterque motu  
accele-



accelerato accedat, quia vterque globulus reagit & vterque est mobilis.

### §. XLVII.

Ex iisdem quoque rationibus concipi potest, cur vase, quantum fieri potest, repleto, globulus a lateribus versus medium vasis tendat. Etenim figura fluidi in vase pleno circa parietes est conuexa, eo vsque enim repleri potest, donec lateralis pressio aquæ, vltra extimam vasis oram eleuata, æqualis euadat cohæsioni particularum aquæ. Rationem figuræ conuexæ versus latera vasis explicatam dedimus §. 43. Quodsi itaque globulus in pariete vasis existat, vase repleto inde recedet, maior enim aquæ quantitas ei adhæret ex altera parte, eo quod aqua ibi altior existit. (§. 46.) In medio autem vasis paullo capacioris altitudo aquæ æqualis est, i. e. plana est superficies, non igitur quiescet, nisi ex omni parte cum æquali quantitate aquæ cohæreat & impetus ex priori motu cessauerit, id quod in notabili demum a parietibus distantia fiet. Hæc phænomena ex cohæsione aquæ cum globulo dictis modis (§. 46. & 47.) oriri, ex eo etiam patet, quia si superficies horum globulorum sebo, dein semine lycopodii obducitur, ita vt aqua globulis haud adhæreat, tantum abest, vt hæc phænomena adpareant, vt potius contrarium obseruetur. Globuli enim quippe corpora graui, quum cohæsiō, quæ in hoc casu nulla est, nihil mutet, ex actione a pondere, ruunt per plana inclinata deorsum. Hinc in vase non repleto a parietibus versus centrum; in vase autem repleto versus parietes mouebuntur, semper nempe versus locum inferiorem.

### §. XLVIII.

Ex tribus vltimis hisce experimentis insolubiles enascuntur difficultates contra principium attractionis. Quodsi enim vim attractiuam concedamus, nulla tamen coniectura adsequi mihi licet rationes, quibus illas  
soluere



soluere velint. Globulus enim in vase non repleto accedit ad parietes vasis; simulac vero vas plenum est, globulus recedit: regressus proficiscitur a vi repellente, attractiua itaque vis in momento commutata est in repellentem. Nihil autem mutatum est in experimento, nisi quod figura superficiei aquæ concaua abierit in conuexam, cæterum adest adhuc aqua, globulus, materia vasis. Quomodo autem ex mutata hacce figura & huius notione tanta metamorphosis fluat, non video. Ergo in aqua, globulo & vase ratio mutationis hæreat, necesse est, cur diuersus eiusmodi sequatur effectus. Ex his sane axioma philosophicum si fieri posset, refellere-  
tur, quod ex iisdem causis positis iisdem circumstantiis, iidem sequantur effectus; quod tamen contra omnem est rationem. Quæ quum acutissimi philosophi procul dubio peruiderent, rationem reddere moliti sunt ex præpollente pressione fluidi adhærentis. Tum vero pace vi-  
rorum doctissimorum quæro, cur exemplum hoc collocauerint in eorum numero, quæ attractionem probarent? Cognita hoc modo est causa tendentiæ, non itaque est impulsus incognitus. (§. 38.) Nec vel ideo repulsionem admittere licet, quia semen lycopodii adhæret vitro; vel, si cum fautoribus attractionis loqui placet, a vitro trahitur; idem semen adhæret sebo & hocce vitro. Nulla igitur patet ratio, quare aqua sebum, & semen lycopodii iuncta non trahantur; quum tamen seorsim trahantur. Pondus enim sensibiliter maius non oritur ex compositione, quod attractioni resistere posset. Multo minus concipere licet, quare attractio mutetur in repulsionem. Plane enim contraria obseruabis phænomena, si superficies vasis sebo, dein semine lycopodii obducitur & vas postea aqua repleatur. Omnia enim repellentur, quæ antea attrahebantur, quum tamen nihil iterum nisi superficies aquæ, antea conuexa, iam mutata sit in concauam, idque per interpositionem corporum, quorum vtrumque a vitro attrahitur.



## §. XLIX.

Quod iam sequitur experimentum omnibus sane physicis plurimum semper facessuit negotii, eo quod legibus in hydrostatica stabilitis penitus sit contrarium; adscensus nempe fluidorum in tubis capillaribus. Cel. MVSCHENBROECKIUS argumentum hoc dignum iudicauit ampliori & accuratiori indagatione, eo quod adscensus fluidi in tubulis distincta cognitio viam pandit ad multa alia eaque hactenus in obscuro posita phænomena eruenda atque clarius euoluenda, inprimis vegetationi & incremento plantarum atque arborum lumen scænerat clarissimum. Experimenta, quæ cum illis cepit, in peculiari dissertatione, quam Dissert. suis physico-mathematicis adiecit, bona fide exhibuit. Quumque adscensum hunc liquorum vti firmum attractionis fulcrum intueantur huius doctrinæ patroni, præcipua momenta abs Viro Cel. obseruata cum nostra explicatione in compendio adhuc subiiciam.

## §. L.

Simulac liquor a tubuli orificio contingitur, ad magnam illico altitudinem & quidem subito assurgit liquor in tubulo.

Ratio huius adscensus generalis eadem est cum ea, quam §pho 45. dedimus. Dum nempe parietes vasis capillaris contingunt fluidum, hoc versus istos mouebitur quumque in cauitate nulla fiat resistentia, penetrabit in eandem & parietes tanget. Hoc contactu denuo æquilibrium ex cohæsione tollitur (§. 45.) nouus itaque fit motus & hinc nouus adscensus. Videtur quidem ac si tali ratione fluidum in infinitum adscendere deberet, ast, quum interiores fluidi partes, quæ nempe parietes non proxime contingunt, ex alia ratione eleuatæ haud sustineantur, quàm quia cum illis cohærent, quæ parietes proxime contingunt h.e. ex cohæsione inter se; eadem hæc mediæ partes in maiori altitudine sustineri, hinc

E

ad



ad maiorem eleuari nequeunt, quam illa est, sub qua pondus partium parietes tubuli non immediate contingentium cohæſioni earumdem inter se est æquale. Data igitur diametro guttulæ & vasis capillaris per leges geometricas & calculum facile est inuenire altitudinem fluidi, sub qua in vase capillari eleuata sustineri potest. Sic posita diametro guttulæ æquali lineæ parisiensi & diametro tubuli 0. 1<sup>///</sup>, altitudo fluidi in tubulo esse deberet æqualis 66<sup>///</sup>.

Magnetismi vniuersalis siue Attractionis, assertores hac ratione explicant adscensum: Vis attractiua per totam tubuli longitudinem in huius materia est diffusa, quæ iunctim agens in aquam, hanc eleuat.

### §. LI.

In tubulis eiusdem & diuersæ longitudinis sed diametri æqualis aqua ad eandem semper fere altitudinem eleuatur. At Cel. MVSCHENBR. aliam condidit regulam, nimirum in tubulis æqualis diametri & diuersæ longitudinis aquæ altitudo crescit, longitudine crescente. Sed (1) ipse obseruauit, altitudinem fuisse æqualem in longioribus & breuioribus eiusdem diametri. (2) Aliquot tabulis obseruatas altitudines exhibet, quumque nostri intersit, tertiam illarum huc transferimus:

Tubi longitudo		Altitudo aquæ
poll.	lin.	poll.
24	0	3 <sup>9</sup> / <sub>16</sub>
11	0	3 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>
8	6	3 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>
7	0	3 <sup>6</sup> / <sub>16</sub>
6	0	3 <sup>4</sup> / <sub>16</sub>
4	6	3 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>
4	0	3 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>
3	0	fere ad orificium vsque.



Ex hac autem tabula patet & quidem (1) ex phænomeno primo & ultimo, tametsi ratio longitudinum sit vt 1 : 8, altitudinum tamen aquæ rationem non esse vt 3 : 4, (2) ex experimento secundo & tertio, sexto & septimo, quod licet longitudines sint vt 17 & 22, non tamen varietatem semper esse in altitudine aquæ. Hoc igitur phænomenon ex legibus attractionis explicari nequit; illæ enim requirunt, vt, quo longior tubus, eo maior massa, hinc & quidem proportionate maior vis attractrix & altitudo esse debeat. Adest autem, si non æqualis; saltem tam exigua altitudinis differentia vt fere nulla sit. Ipsa autem differentia ex euaporatione aquæ proficisci omnino potest, vtpote quæ in breuioribus quidem tubis æque fit ac in longioribus, ast quia in breuioribus aer exterior accedere & partes euaporatas auferre, idem vero in longioribus non efficere potest; in longioribus istæ partes, quæ euaporarunt & parietibus adhærent, inferioribus nouum contactum hinc nouam adscensus causam exhibent. (§. 45.) Quumque euaporatio non fiat sensibilis, nisi post notabile tempus, patet simul ratio, quare hæc phænomena non fiant, nisi post 12 vel 16 horas: immo quia interdum fluida plus interdum minus euaporant, fieri hinc potuit, vt sub inæquali longitudine tubi, æqualis tamen esset altitudo aquæ.

### §. LII.

In tubis æqualis longitudinis, sed inæqualium diametrorum reperit Cel. MVSCHENBR. altitudines aquæ esse in ratione inuersa diametrorum, tuborum; seu peripheriarum basium; seu superficierum, quas tubi habent interne. Hinc quantitates aquæ eleuatæ in his sunt vt diametri basium. Tubi igitur ampliores maiorem aquæ copiam eleuant, quam angustiores in minori altitudine. Hæc autem dictis (§. 50.) contradicere videntur. Enimvero, quoniam in capacissimo etiam vase fluidum ad parietes vasis ad altitudinem dimidiæ guttæ adscendit, &



hoc pacto ob magnitudinem superficiei tot fere dimidia guttulæ adscendunt, quot diametri guttulæ in peripheria vasis poni possunt & sic hoc considerandum ac si plures guttulæ, quælibet seorsim, in peripheria cuiusdam circuli sustinerentur; in angustioribus autem canalibus ad tantam altitudinem fluidum adscendere nequit sub qua sustineri posset, quia per superiorum adscensum, præter pondus, cohæsiō omnium partium lateralis, cum iis nempe, quæ parietes proxime tangunt, est superanda, quæ tanto maior, quo angustius est vas, quia superficies in angustioribus relative maior est, quam in capacioribus; ob maiorem igitur resistantiam fluidum ad eam altitudinem adscendere non potest, ad quam adscensurum esset, si solum pondus resisteret. In canalibus ergo capacioribus maior, in angustioribus minor quantitas hæret quam est guttula.

## §. LIII.

Fluida denique ratione gravitatis specificæ diuersa adhibuit Vir solertissimus magnamque altitudinum differentiam deprehendit adeo, vt nihil determinare ausus fuerit. Tabula iterum altitudines obseruatas adiiciam, eo quod contineat, quæ ad rem nostram faciunt.

I. Nomina liquorum :	II. Eorundem gravitates specif.	III. Altitudines in tu- bulo 43 lineas longo lineæ	IV. Altitudines Cel. Carrei in tubo breu. lin.
Oleum Vitrioli	1700	26, 27	
Oleum Tartari	1550	25, 26	5, 6
Spiritus Nitri	1315	20	4
Spir. Sal. Ammon.	1120	30, 33	
Vrina	1030	33, 34	
Aqua	1000	26	5, 7, 10
Ol. Raparum	913	21	
Ol. Thereb.	874	18, 19	4
Alcohol Spir. Vini	866	18	3½, 4



Ex collata grauitate specifica & altitudine fluidorum manifestum euadit, 1) adscensum fluidorum non fieri in ratione inuersa grauitatum suarum. Ex pressione itaque aeris adscensus deduci nequit. Quodsi enim pressio illa causa esset, ratio inuersa locum obtinere deberet per leges hydrostaticas. Nec sunt altitudines vt fluiditates liquorum; alcohol enim fluidissimum minimam habet altitudinem. 2) Elucet porro ex tabula, phaenomena adscensus fluidorum non posse conciliari cum legibus attractionis. Prono enim alueo ex assumpta attractione sequitur, vt liquor leuissimus sit altissimus h. e. vt altitudines crescere debeant in ratione inuersa grauitatum specif. Etenim quum vis attractiua tanta sit, vt oleum Vitrioli ad 27 lin. altitudinem eleuet; illa autem eadem maneat, Alcohol sane per eandem vim multo altius attollatur necesse est, minor enim est ipsius grauitas & minor ideo resistentia ex grauitate. Sed euenit contrarium. Experientia autem si assumptæ hypothese contradicit, hæce omnino corrui. Vt hypothese igitur nequimus admittere attractionem, tantum abest vt hanc doctrinam pro vera certaue amplectamur. Ex nostro denique 3) principio & cohaesionis regulis phaenomena hæce explicari posse ostendam. Ex tabula patet, altitudines fluidorum crescere crescentibus grauitatibus specificis. Vrina quidem & Spiritus Salis Ammon. ab hac regula discedunt, verum quum vtrique multum salis alcalici volatilis; vel ammoniacalis insit, quo euaporante altitudo fluidi admodum augeri potest, veluti in vegetationibus Chemicis fieri solet, dum nempe illud, quod euaporat, parietibus adhæret & sic nouum contactum fluido ad adscensum (§. 45.) nouamque sustentationem suppeditat: haud credo, his duobus fluidis peculiare quid continentibus, inductionem a plerisque desumptam, infringi posse. Fluida autem quo sunt specificè grauiora, eo fortius, cæteris paribus, coherant; eo maiores

E 3

formant



formant guttulas & eo maiori etiam vi ex adhæsione agunt; altius itaque etiam adscendant necesse est.

§. LIV.

Cæterum adscensus fluidorum motu fit retardato, initio perceleri, tardiori dein & denique tardissimo, ita vt post aliquot horarum interuallum fluidum adhuc eleuetur, quod quidem aliter fieri nequit. Ponderum enim fluidi & ipsa cohæsiō partium inferiorum cum parietibus quum adscensui resistent, pondus vero & numerus partium resistentium crescant vna cum altitudine, non potest non, resistentia continuo crescente; impetu autem simul non crescente, motus retardari.

§. LV.

Quando duo plana vitrea in situ verticali ita iunguntur, vt in vna parte sese contingant, in altera paululum a se recedant, ita vt angulum exiguum forment; dein pars eorum inferior aquam contingat & aqua illico adscendet inter plana hæcce ad diuersas altitudines, quod enim interuallum inter illa fit maius; eo altitudo aquæ fit minor, hinc linea curua exoritur, quam post examen accuratum hyperbolam esse inuenerunt Viri celeberrimi: vide illud descriptum a Cel. s'GRAVESANDIO in *Element. Phys. Mathemat. L. I. p. 1. c. 5.* Curiosum illud est experimentum; quum autem ratio adscensus & diuersæ altitudinis ex Sphis 52. 53. peti possit, non opus est peculiari explicatione.

§. LVI.

Postquam igitur in primariis phænomenis ostendimus, quæ ipsi illi attractionis stabilitores pro primariis venditant; illa, absque attractione, felicius longe solui posse ex sola adhæsione eiusque regulis, immo multa ex attractionis legibus plane non solui posse, quin his contraria




traria esse (§. 53.) non sane videmus, cur vim attractiuam inter naturæ leges referamus. Quod si enim vltimum non esset, vt superfluum saltem attractio adsumeretur. Nihil itaque superest, nisi vt adhuc ostendamus, quænam legum adhæisionis & attractionis sit differentia & quantum illæ præ his excellent.

## §. LVII.

Differunt autem, vti supra iam dictum est, in eo, quod 1) leges adhæisionis supponant semper contactum immediatum, attractionis vero non, 2) quod leges attractionis sint duplices, attractionis nempe & repulsionis: phaenomena autem, vbi separatio obseruatur, longe elegantius ex legibus cohæisionis fluidorum inter se explicantur. Excellunt vero leges adhæisionis præ attractionis regulis in eo (1) quod illæ nihil ponant, nisi conditiones & effectum & vtrumque per experientiam tantum; hæ vero sint quidem leges mathematicæ; sed hypothese superstructæ & quidem erroneæ, hinc etiam ipsæ sunt falsæ. (2) quod istæ determinent vniuersim quænam sint istæ conditiones, sub quibus adhæisio fit, nempe grauitas adhærentis specifica debet esse vel minor vel æqualis grauitati specificæ istius, cui adhæret; & sub quibus nulla fit adhæisio, nempe vbi fluidum solido est specificè grauius & paullo maiori quantitate collectum: hæ tales conditiones vniuersales non ponant, sed per singularia experimenta tantum cognoscitur, quænam sese trahant quæue se repellant.

S. D. L. A. G.





G. D. N. V. G.